

fluorouracil crème

informatieformulier voor behandeling met fluorouracil crème (Efudix®)


Behandeling met fluorouracil crème (merknaam: Efudix®) wordt het meest voorgeschreven bij vroege voorstada van huidkanker. Het middel kan echter ook gebruikt worden bij behandeling van vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN). Efudix crème remt de celdeling van cellen. Vooral cellen die sneller delen dan normaal – zoals bij voorstada van (huid)kanker vaak het geval is – reageren hier goed op.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het middel ook werkzaam is bij VIN. Het is nog onduidelijk bij hoeveel procent van alle personen met VIN het middel ook daadwerkelijk genezend werkt.

De behandeling

De crème moet gedurende 16 weken achter elkaar worden gebruikt op drie dagen per week. Bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag. Breng voor het slapengaan met de vinger de juiste hoeveelheid crème aan op de huidafwijking en smeert deze uit over het gebied waarbij u een extra marge van een halve centimeter rondom de afwijking aanhoudt.

Hiervoor moet per keer 0,5 tot 1 gram van de crème worden gebruikt. Dit komt overeen met één tot twee naast elkaar gelegen streepjes crème op de lengte van één vingertop. In onderstaande afbeelding is één zo'n streepje (0,5 gram) zichtbaar.



Duur van de behandeling

De meeste patiënten krijgen het advies de behandeling 16 weken vol te houden. Halverwege deze behandelperiode wordt er voor u een afspraak gemaakt op de vulvapatiënt om het effect van de behandeling tussentijds te controleren en de eventuele bijwerkingen te bespreken.

Bijwerkingen en belasting

Door het gebruik van dit middel krijgen patiënten vaak last van jeuk, milde tot matige branderigheid of (lichte) pijn rond het behandelde gebied. In een enkel geval kan er gering bloedverlies optreden. Bij het optreden van heftige jeuk- of pijnklachten adviseren wij om de crème één of enkele dagen niet te gebruiken. Soms kan het nodig zijn de crème gedurende een hele week niet te gebruiken. Hebt u vragen over bijwerkingen die optreden of twijfelt u of u wel of niet moet stoppen: neem dan contact op met polivrouw@erasmusmc.nl.

Pijn

Als er pijnklachten ontstaan door de behandeling kan paracetamol heel effectief zijn. Wij adviseren u deze in dat geval dan ook in te nemen. Het is belangrijk niet incidenteel een paracetamol tablet in te gebruiken maar gedurende de dag driemaal twee tabletten van 500 mg. in te nemen. Bij de meeste patiënten zijn de pijnklachten tijdelijk en dus niet gedurende de hele behandelperiode aanwezig.

Controle

Ongeveer 2 tot 4 weken na het laatste gebruik van de crème, kan het eindresultaat klinisch worden beoordeeld of eventueel een biopt worden afgenomen om het effect van de behandeling te evalueren. Dit kan ook enkele weken later gebeuren als de vulva nog gevoelig blijft na de behandeling.

Samenvatting

behandeling	bijwerkingen of complicaties
mogelijke bijwerkingen	milde tot matige branderigheid, pijn rond het behandelde gebied, jeuk of irritatie met roodheid en zwelling.
geschatte kans op bijwerkingen	milde tot matige branderigheid treedt bij vrijwel iedereen (85%) op; de overige klachten komen veel minder vaak voor.
blootstelling aan zonlicht	behandelde huid en slijmvliezen zijn gevoeliger voor licht dan normaal; er kan dus sneller verbranding door UV-licht optreden.
complicaties op de langere termijn	geen bekend