

balanitis van Zoon

Informatiefolder

In 1952 beschreef professor Zoon uit Utrecht de “balanoposthitis chronica circumscripta benigna plasmacellularis” (BCCBP) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Bij een groep van acht Utrechters in de leeftijd van 24 tot 74 jaar met felrode, fluweelachtige afwijkingen op penis en/of voorhuid meende Zoon dat de afwijking niet veroorzaakt werd door huidkanker en ook niet door een soa zoals syfilis. Wat wel de oorzaak was, was ook professor Zoon niet helemaal duidelijk.

De behandeling

In de hedendaagse literatuur wordt de “balanitis plasmacellularis circumscripta” omschreven als zeldzame, goedaardige huidafwijking die vrijwel uitsluitend voorkomt bij onbesneden mannen van 40 jaar en ouder. De aandoening veroorzaakt soms minimale jeuk of gevoeligheid en is meestal gelokaliseerd aan zowel de eikel als aan de binnenzijde van de voorhuid. Oorzakelijke factoren zouden chronische infecties kunnen zijn waarbij *Mycobacterium smegmatis* regelmatig wordt genoemd.

Behandeling met de grootste kans op blijvend succes is een besnijdenis. Ook blijkt tacrolimuszalf (Protopic) soms effectief, net als fusidinezuur en imiquimodcrème (Aldara). Behandeling met de CO₂-laser werd ook als effectief beschreven. Behandeling met hormoonzalven en anti-schimmelpreparaten is wisselend effectief.

Vragen?

Indien u na het lezen van dit informatieformulier nog vragen heeft, kunt u deze uiteraard stellen tijdens uw eerstvolgende afspraak op onze afdeling.