

# Azathioprine (Imuran)

## Wat is Azathioprine:

Azathioprine is een medicament dat de afweer onderdrukt. Dit medicijn wordt voorgeschreven bij auto-immuunziekten. Het heeft een ontstekingsremmend effect.

## Wijze van toediening:

Azathioprine wordt 1 maal daags in tabletvorm gegeven.

Na het starten duurt het 4 tot 8 weken voor de Azathioprine gaat werken. Dan hopen we dat de behandeling aanslaat en de ziekte onder controle komt. Als de ziekte onder controle is gekomen, zullen de meeste kinderen nog jaren doorbehandeld worden met Azathioprine.

## Bijwerkingen van Azathioprine:

Het is belangrijk te weten dat de meeste kinderen geen last van bijwerkingen hebben.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Maag-darmklachten als buikpijn, misselijkheid, braken en diarree
- Afwijkingen van de bloedcellen, zoals bloedarmoede en lagere witte bloedcellen
- Haaruitval
- Ontsteking van de alvleesklier
- Soms een allergische reactie met jeuk of galbulten
- Verhoogd risico op infecties en een eventuele infectie kan ernstiger verlopen

## Wat te doen bij koorts ?

Bij een lichaamstemperatuur > 38.5 °C moet de Azathioprine overgeslagen worden. Als de lichaamstemperatuur tussen de 38 en 38.5 °C is, kunt u overwegen de Azathioprine over te slaan, dit hangt af van de klachten van de patient. Bij verkoudheid, milde griepachtige verschijnselen zonder hoge koorts kan de Azathioprine gewoon gecontinueerd worden.

## Wanneer moet u contact opnemen met de huisarts ?

Wij adviseren u contact met de huisarts of de behandelend arts op te nemen bij:

- Blaasjes of afters in de mond
- Kortademigheid of veel hoesten
- Erge keelpijn in combinatie met koorts
- Herhaaldelijk een bloedneus
- Snel en veel blauwe plekken
- Hoge koorts gedurende twee dagen en veel blaasjes bij waterpokken

## Wat kun je doen tegen de bijwerkingen:

Het beste is om de tabletten na de maaltijd met een glas water zonder te kauwen in te nemen.

Hierdoor vermindert de kans op misselijkheid.

Bij ernstige bijwerkingen als koorts, rillingen, spierpijn en/of benauwdheid moet u overleg plegen met uw behandelend arts.

Het bloed wordt regelmatig gecontroleerd om eventuele bijwerkingen snel op te sporen. Soms wordt het middel (tijdelijk) gestopt vanwege de bijwerkingen.

Vaak gaan bijwerkingen weer over als het lichaam gewend is aan het nieuwe medicijn. Wanneer dat niet het geval is en de kinderen er teveel last van hebben, zal de arts een ander medicijn voorschrijven.

Als uw kind de adolescenten leeftijd bereikt heeft, zijn andere overwegingen van belang. Het drinken van alcohol is niet verstandig omdat het de kans op leverschade door Azathioprine vergroot.

## Azathioprine (Imuran)

Wanneer uw kind een oproep krijgt voor de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma (DKTP, BMR, HIB, Pneumokokken, HPV), kunt u het beste even overleggen met de behandelend arts van uw kind wanneer het deze mag hebben.