

Hydroxychloroquine (Plaquenil)

Wat is Plaquenil:

Plaquenil is een medicijn wat gebruikt wordt bij Reumatoïde Artritis (een vorm van reuma die bij volwassenen voorkomt), SLE en soms ook bij juveniele dermatomyositis , mixed connective tissue disease of jeugdreuma. Het werkt ontstekingsremmend en kan de ziekte rustiger maken. Hierdoor vermindert het risico van schade door de ziekte. Vermoeidheid, spierpijn, gewrichtsklachten en stijfheid kunnen na enige tijd afnemen. Het risico op de vorming van trombose vermindert en bij SLE is er minder kans op nier- en hersenbetrokkenheid. Ook wordt bij SLE patiënten waarvan de ziekte inactief is, de kans dat de ziekte opnieuw actief wordt kleiner.

Het effect van Plaquenil treedt pas op na 3-4 maanden. Omdat Plaquenil zoveel gunstige effecten heeft en in het algemeen uitstekend wordt verdragen, zullen de meeste kinderen en volwassenen met SLE jarenlang behandeld worden met Plaquenil.

Wijze van toediening:

Uw kind moet dit medicijn dagelijks 1 x per dag innemen. Het is beschikbaar in tabletten. Het beste tijdstip is vlak voor, tijdens of vlak na de maaltijd, op een vast moment per dag. De dosering is afhankelijk van het gewicht, de aandoening en conditie van uw kind.

Bijwerkingen van Plaquenil:

De meeste kinderen hebben geen last van bijwerkingen.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Misselijkheid en maag-darmklachten
- Huiduitslag
- Haaruitval
- Jeuk
- Oogaandoeningen, dit is meestal zonder dat er klachten zijn. Heel soms kan het kind wazig gaan zien en last krijgen van lichtflitsen of lichtschuwheid
- Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, doofheid
- Zenuw- en spieraandoeningen zoals tintelingen of een doof gevoel in armen en benen, epilepsie of spierzwakte.
- Psychische problemen als bijvoorbeeld angst, of nervositeit
- Zeer zelden ontstaan bloedafwijkingen

Deze verschijnselen verdwijnen weer als de Plaquenil gestopt wordt.

Wat kun je doen tegen de bijwerkingen:

Om misselijkheid en maag-darmklachten te voorkomen kun je het beste de Plaquenil vlak voor, tijdens of na de maaltijd innemen.

Een jaarlijks bezoek aan de oogarts is noodzakelijk om gecontroleerd te worden op aandoeningen van het oog.

Het bloed wordt regelmatig gecontroleerd op lever- en nierfunctiestoornissen. Soms wordt het middel (tijdelijk) gestopt vanwege de bijwerkingen.