

Leflunomide (Arava)

Wat is Leflunomide (Arava):

Leflunomide is een medicament dat de afweer onderdrukt. Het heeft dan een ontstekingsremmend effect. Hierdoor vermindert/verdwijnt de pijn en stijfheid in de gewrichten.

Wijze van toediening:

Leflunomide wordt in tabletvorm voorgeschreven, 1 x daags. Na het starten duurt het 4 tot 8 weken voor de Leflunomide gaat werken. Dan hopen we dat de behandeling aanslaat en de ziekte onder controle komt. Als de ziekte onder controle is gekomen, zullen de meeste kinderen nog gedurende lange tijd doorbehandeld worden met Leflunomide.

Bijwerkingen van Leflunomide(Arava):

Het is belangrijk te weten dat de meeste kinderen geen last van bijwerkingen hebben.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Maag-darmklachten als misselijkheid, braken, diarree en buikpijn
- Blaren of afters in de mond door ontsteking van de mondslijmvliezen
- Hoofdpijn, duizeligheid, tintelende handen en/of voeten
- Eczeem, huiduitslag, jeuk, haaruitval
- Vrouwen en mannen met zwangerschapswens: Leflunomide verhoogt het risico op ernstige aangeboren afwijkingen bij het kind. Een zogenaamde wash-out procedure bij zwangerschapswens is geïndiceerd, hiermee wordt met een medicijnkuur van 11 dagen de Leflunomide uit het lichaam verwijderd.
- Leverfunctiestoornissen
- Verhoging van de bloeddruk
- Verhoogde kans op infecties

Wat te doen bij koorts ?

Bij een lichaamstemperatuur > 38.5 moet de leflunomide overgeslagen worden. Als de lichaamstemperatuur tussen de 38 en 38.5 is, kunt u overwegen de leflunomide over te slaan. Dit hangt af van de klachten van de patient. Bij verkoudheid, milde griepachtige verschijnselen zonder hoge koorts en/of hoesten kan de leflunomide gewoon gecontinueerd worden.

Wanneer moet u contact opnemen met de huisarts ?

Wij adviseren u contact met de huisarts of de behandelend arts op te nemen bij:

- Blaasjes of afters in de mond
- Kortademigheid of veel hoesten
- Erge keelpijn in combinatie met koorts
- Herhaaldelijk een bloedneus
- Snel en veel blauwe plekken
- Hoge koorts gedurende twee dagen en veel blaasjes bij waterpokken

Wat kun je doen tegen de bijwerkingen:

Tegen misselijkheid kunnen medicijnen voorgeschreven worden.

Het beste is om de tabletten na de maaltijd met een glas water zonder te kauwen in te nemen.

Hierdoor vermindert de kans op misselijkheid.

Het bloed wordt regelmatig gecontroleerd om eventuele bijwerkingen snel op te sporen. Soms wordt het middel (tijdelijk) gestopt vanwege de bijwerkingen.

Leflunomide (Arava)

Vaak gaan bijwerkingen weer over als het lichaam gewend is aan het nieuwe medicijn. Wanneer dat niet het geval is en de kinderen er teveel last van hebben, zal de arts een ander medicijn voorschrijven.

Als uw kind de adolescenten leeftijd bereikt heeft, zijn andere overwegingen van belang. Het drinken van alcohol is niet verstandig omdat het de kans op leverschade door leflunomide vergroot.

Leflunomide is schadelijk voor het ongeboren kind. Het gebruik van anticonceptie bij patiënten die seksueel actief zijn, is noodzakelijk.

Wanneer uw kind een oproep krijgt voor de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma (DKTP, BMR, HIB, Pneumokokken, HPV), kunt u het beste even overleggen met de behandelend arts van uw kind wanneer het deze mag hebben.